

Nyt studie viser, at nyopererede med ileostomi **sjældent skifter fra konveks løsning**


Et svensk journalstudie afdækker ny viden om produktskift blandt personer med stomi i løbet af de første 12 måneder efter operation. Studiet viser, at kun 3 % af de personer med ileostomi, der starter på en konveks løsning, skifter løsning senere i forløbet i stomiklinikken, mens næsten 60 % skifter, når de starter på en flad løsning.

Studiet blev gennemført i Sverige i syv stomiklinikker og omfattede i alt 240 personer med stomi. Formålet med studiet er at beskrive graden af lækage og peristomale hudkomplikationer blandt personer, der besøger stomisygeplejersken i løbet af det første år efter anlæggelse af stomi, samt at undersøge hyppigheden af besøg hos stomisygeplejersken og brugen af stomiprodukter.


Jørn | Bruger, Stomi



Produktskift for personer med ileostomi



Andel af personer med ileostomi, der starter på konveks eller flad løsning



Formål

At beskrive graden af lækage og peristomale hudkomplikationer blandt personer, der besøger stomisygeplejersker (SCN) i løbet af det første år efter anlæggelse af stomi. Desuden at undersøge hyppigheden af besøg hos SCN og brugen af stomiprodukter.

Studiedesign

Et deskriptivt, observationelt studie baseret på retrospektive data fra lægejournaler. Studiet benytter en undergruppe fra et svensk landsdækkende registerstudie, og data er koblet sammen ved hjælp af personlige identifikationsdata. Syv stomiklinikker i regionerne Stockholm, Östergötland, Halland og Skåne deltog.

Population

Inklusionskriterierne var de 50 seneste personer pr. klinik, i alderen > 18 år, kolostomi/ileostomi anlagt senest den 31. december 2018. I alt 327 personer blev inkluderet i undersøgelsespopulationen. Kun de, der gennemførte en fuld 12-måneders opfølgning, blev inkluderet i denne publikation, i alt 240 personer.

Resultater

Studiet viser bl.a., at kun 3 % af personer med ileostomi, der starter på en konveks løsning, skifter efterfølgende til en anden plade, mens næsten 60 % skifter, når de starter på en flad løsning. Desuden er det kun 39 % af personer med ileostomi, der starter med en konveks løsning.

Supplerende resultater

Personer med ileostomi er mere belastet af lækage og peristomale hudkomplikationer og besøger oftere stomisygeplejersken end personer med kolostomi. På tværs af stomityper udløser episoder med lækage og peristomale hudkomplikationer i gennemsnit omkring ét ekstra stomisygeplejerskebesøg og øget brug af tilbehørsprodukter. Personer, der gennemgår akut kirurgi, personer med høj ASA-klassifikation samt kvinder, oplever flere episoder med lækage, peristomale hudkomplikationer og stomisygeplejerskebesøg.

Persson E. et al., Stoma Care Nurse Consultations Regarding Leakages and Peristomal Skin Complications During the First Year After Ostomy Creation: A Chart Review. International Wound Journal 2025.

